

УДК 37.016:51

**Татьяна Александровна Оболдина,  
Полина Евгеньевна Кед**  
г. Шадринск

### **Методы решения уравнений четвертой степени**

Авторы статьи рассматривают один из важных вопросов алгебры - уравнения четвертой степени и методы их решения, более подробно описывая два метода: метод Феррари и метод Декарта-Эйлера. В первую очередь рассматривается исторический аспект и основные принципы решения уравнений четвертой степени. Далее подробно описан метод Феррари, основанный на приведении уравнения к квадратному уравнению. В статье также описан метод Декарта-Эйлера, основная идея которого сведение к решению кубического уравнения и комбинаторному перебору корней, с учетом знаков и различных их переборов. Этот метод позволяет эффективно и компактно решать уравнения четвертой степени по сравнению с методом Феррари. После теоретических аспектов данной темы авторы демонстрируют рассмотренные методы на конкретных примерах.

**Ключевые слова:** уравнения четвертой степени, метод Декарта-Эйлера, метод Феррари.

**Tatyana Alexandrovna Oboldina,  
Polina Evgenievna Ked**  
Shadrinsk

### **Methods for solving the fourth-degree equations**

The authors consider one of the important questions of algebra - the fourth-degree equations and methods of their solution, describing in more detail two methods: the Ferrari method and the Descartes-Euler method. First of all, the historical aspect and the basic principles of solving the fourth-degree equations are considered. Then, the Ferrari method is described in detail based on reducing the equation to a quadratic equation. The article also describes the Descartes-Euler method, the main idea of which is to reduce to solving a cubic equation and combinatorial enumeration of roots taking into account signs and their various iterations. This method makes it possible to solve the fourth-degree equations efficiently and compactly compared to the Ferrari method. After the theoretical aspects of this topic, the authors demonstrate the considered methods with specific examples.

**Keywords:** the fourth-degree equations, the Descartes-Euler method, the Ferrari method.

Уравнения четвертой степени и методы их решения представляют собой важный аспект в области математики, привлекающий внимание математиков на протяжении столетий. В отличие от уравнений низших степеней, решение уравнений четвертой степени представляет собой более сложную задачу из-за отсутствия общего алгебраического метода.

В конце XV – начале XVI веков наступил период бурного развития математики, исследователи начали разрабатывать различные методы решения уравнений. Именно в это время важную роль сыграли такие итальянские математики, как Джероламо Кардано и Лодовико Феррари, внесшие значительный вклад в изучении теоретических и практических вопросов решения уравнений четвертой степени [2].

Известный математик Лодовико Феррари ещё в XVI в. описал решение уравнения четвертой степени. Это решение было основано на преобразовании исходного уравнения в два квадратных. Хотя это метод был эффективным, он требовал доработок и

усовершенствований [6]. В XVII в. французский математик Рене Декарт и швейцарский математик Леонард Эйлер разработали иной способ решения уравнений четвертой степени, который в настоящее время называют методом Декарта-Эйлера.

Данный метод основан на замене переменных и приведении его к кубической форме. Этот метод позволил эффективно и менее трудоёмко получить решение уравнения четвертой степени по сравнению с первым рассматриваемым методом [8].

Рассмотренные методы решения уравнения четвертой степени достаточно трудоёмки и сложны и, на основании этого, их лучше демонстрировать в старших классах т. к. учащиеся имеют уже все основные знания по алгебре и способны изучить более сложные математические выкладки.

Рассмотрим в общем виде уравнение четвертой степени:

$$a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0, (1)$$

где  $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$  – некоторые действительные числа, где  $a_0 \neq 0$ .

Опишем, в чём заключается метод Феррари.

Данный метод состоит из двух этапов.

На первом этапе исходное уравнение (1) представляют как уравнение четвертой степени, не содержащее членов с третьей степенью.

На втором этапе, уже полученное уравнение решают, используя разложение на множители [7].

Так как старший коэффициент  $a_0 \neq 0$ , то разделим на  $a_0$  уравнение (1):

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, (2)$$

где  $a, b, c, d$  – некоторые действительные числа.

В полученном уравнении  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  (2) выполним замену

$$x = z - \frac{a}{4}, (3)$$

где  $z$  – новая переменная [4].

Выполним преобразования, подставив выражение в уравнение. В результате получим неполное уравнение четвертой степени относительно  $z$ .

$$z^4 + z^2 \left( b - \frac{3a^2}{8} \right) + z \left( \frac{a^3}{8} - \frac{ab}{2} + c \right) - \frac{3a^4}{256} + \frac{a^2b}{16} - \frac{ca}{4} + d = 0. (4)$$

Снова введем новые обозначения коэффициентов:

$$l = b - \frac{3a^2}{8}, m = \frac{a^3}{8} - \frac{ab}{2} + c, n = -\frac{3a^4}{256} + \frac{a^2b}{16} - \frac{ca}{4} + d,$$

И получим уравнение  $z^4 + lz^2 + mz + n = 0$ , (5)

где  $l, m, n$  – некоторые действительные числа.

Выполним ещё преобразования, прибавляя и вычитая к левой части уравнения (5) выражение

$$2tz^2 + t^2,$$

где  $t$  – некоторое число. Из (5) получим

$$\begin{aligned} z^4 + lz^2 + mz + n &= z^4 + 2tz^2 + t^2 + (l - 2t)z^2 + mz + n - t^2 = \\ &= (z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z^2 + 2 \cdot \frac{mz}{2(l - 2t)} \right) + n - t^2 = \\ &= (z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z^2 + 2 \cdot \frac{mz}{2(l - 2t)} + \frac{m^2}{4(l - 2t)^2} \right) + n - t^2 - \frac{m^2}{4(l - 2t)^2} = \end{aligned}$$

$$= (z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z + \frac{mz}{2(l - 2t)} \right)^2 + n - t^2 - \frac{m^2}{4(l - 2t)^2}.$$

В итоге уравнение (5) можно записать в виде:

$$(z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z + \frac{mz}{2(l - 2t)} \right)^2 + n - t^2 - \frac{m^2}{4(l - 2t)^2} = 0. \quad (6)$$

Заметим, что выбирая число  $t$  необходимо, чтобы оно было решением уравнения

$$n - t^2 - \frac{m^2}{4(l - 2t)^2} = 0, \quad (7)$$

При этом уравнение (6) примет вид

$$(z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z + \frac{mz}{2(l - 2t)} \right)^2 = 0. \quad (8)$$

Преобразуем ещё раз уравнение, освободившись от знаменателя

$$2t^3 - lt^2 - 2nt + nl - \frac{m^2}{4} = 0. \quad (9)$$

Получили *кубическую резольвенту* уравнения четвертой степени (5).

$$\begin{aligned} & (z^2 + t)^2 + (l - 2t) \left( z + \frac{m}{2(l - 2t)} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (z^2 + t)^2 - (l - 2t) \left( z - \frac{m}{2(l - 2t)} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (z^2 + t)^2 - \left( z\sqrt{2t - l} - \frac{m}{2\sqrt{2t - l}} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left( z^2 - z\sqrt{2t - l} + \frac{m}{2\sqrt{2t - l}} + t \right) \cdot \left( z^2 + z\sqrt{2t - l} - \frac{m}{2\sqrt{2t - l}} + t \right) = 0. \end{aligned}$$

Итак, для решения уравнения (8) необходимо решить два квадратных уравнения

$$z^2 - z\sqrt{2t - l} + \frac{m}{2\sqrt{2t - l}} + t = 0, \quad (10)$$

$$z^2 + z\sqrt{2t - l} - \frac{m}{2\sqrt{2t - l}} + t = 0. \quad (11)$$

В результате исходное уравнение четвертой степени решается как последовательное решение одного кубического и двух квадратных уравнений.

Продemonстрируем на примере данный метод.

*Пример.* Решить уравнение  $x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 4x - 8 = 0$  (13).

*Решение.*

В исходном уравнении (13) произведём замену по формуле (3) и выполним подстановку

$$x = y + \frac{1}{2} \quad (14);$$

$$\begin{aligned} x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 4x - 8 &= \left( y + \frac{1}{2} \right)^4 - 2 \left( y + \frac{1}{2} \right)^3 + 2 \left( y + \frac{1}{2} \right)^2 + 4 \left( y + \frac{1}{2} \right) - 8 = \\ &= y^4 + \frac{1}{2}y^2 + 5y - \frac{91}{16}. \end{aligned}$$

Получим уравнение

$$y^4 + \frac{1}{2}y^2 + 5y - \frac{91}{16} \quad (15).$$

Коэффициенты уравнения (15) равны:

$$l = \frac{1}{2}, \quad m = 5, \quad n = -\frac{91}{16} \quad (16).$$

Кубическая резольвента для уравнения (15) имеет вид:

$$2t^3 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{91}{8}t - \frac{291}{32} = 0; \quad 2;$$
$$t^3 - \frac{1}{4}t^2 + \frac{91}{16}t - \frac{291}{64} = 0. \quad (17)$$

Найдём корни уравнения  $t_1 = \frac{3}{4}$ ,  $t_2 = -\frac{1}{4} + \sqrt{6}i$ ,  $t_3 = -\frac{1}{4} - \sqrt{6}i$ .

Подставим значения (16) и  $t_1$  в формулу (10) и получим уравнение  $y^2 - y + \frac{13}{4} = 0$ , а затем его корни

$$y_1 = \frac{1}{2} + \sqrt{3}i, \quad y_2 = \frac{1}{2} - \sqrt{3}i. \quad (18)$$

Затем аналогичным способом получим уравнение

$$y^2 + y - \frac{7}{4} = 0,$$

которое имеет корни

$$y_3 = \frac{-1 + 2\sqrt{2}}{2}, \quad y_4 = \frac{-1 - 2\sqrt{2}}{2}. \quad (19)$$

Используя формулу (14), найдём корни уравнения (13) из (18) и (19):

$$x_1 = 1 + \sqrt{3}i, \quad x_2 = 1 - \sqrt{3}i, \quad x_3 = \sqrt{2}, \quad x_4 = -\sqrt{2}.$$

*Ответ:*  $1 + \sqrt{3}i, 1 - \sqrt{3}i, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$ .

Рассмотрим второй метод решения уравнений четвертой степени – метод Декарта-Эйлера. Суть метода состоит в том, что необходимо исходное уравнение преобразовать в неполный вид  $x^4 + ax^2 + bx + c = 0$  с помощью замены  $x = y - \frac{a}{4}$  [3].

Пусть корнем уравнения будет сумма трех чисел

$$x = y_1 + y_2 + y_3,$$

тогда выполним замену.

$$(y_1 + y_2 + y_3)^4 + a(y_1 + y_2 + y_3)^2 + b(y_1 + y_2 + y_3) + c = 0;$$
$$(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3))^2 + a(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3)) + b(y_1 + y_2 + y_3) + c = 0;$$
$$(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + 4(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 4(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3)^2 + a(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 2a(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3) + b(y_1 + y_2 + y_3) + c = 0;$$
$$(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + 4(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 4(y_1^2y_2^2 + y_1^2y_3^2 + y_2^2y_3^2) + 8y_1y_2y_3(y_1 + y_2 + y_3) + a(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 2a(y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3) + b(y_1 + y_2 + y_3) + c = 0.$$

Сгруппируем

$$(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + (y_1 y_2 + y_1 y_3 + y_2 y_3)(4(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 2a) + 4(y_1^2 y_2^2 + y_1^2 y_3^2 + y_2^2 y_3^2) + (y_1 + y_2 + y_3)(8y_1 y_2 y_3 + b) + a(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + c = 0.$$

Предположим, что  $8y_1 y_2 y_3 + b = 0$  и  $4(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 2a = 0$ . Тогда уравнение запишется в виде системы уравнений:

$$\begin{cases} 8y_1 y_2 y_3 + b = 0 \\ 4(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + 2a = 0 \\ (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + 4(y_1^2 y_2^2 + y_1^2 y_3^2 + y_2^2 y_3^2) + a(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + c = 0 \end{cases};$$

$$\begin{cases} y_1 y_2 y_3 = -\frac{b}{8} \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = -\frac{a}{2} \\ \left(-\frac{a}{2}\right)^2 + 4(y_1^2 y_2^2 + y_1^2 y_3^2 + y_2^2 y_3^2) + a\left(-\frac{a}{2}\right) + c = 0 \end{cases};$$

$$\begin{cases} y_1 y_2 y_3 = -\frac{b}{8} \\ y_1^2 y_2^2 y_3^2 = \frac{b^2}{64} \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = -\frac{a}{2} \\ y_1^2 y_2^2 + y_1^2 y_3^2 + y_2^2 y_3^2 = \frac{a^2 - 4c}{16} \end{cases} [5].$$

Используя теорему Виета, получим кубическое уравнение

$$y^3 + \frac{ay^2}{2} + \frac{(a^2 - 4c)y}{16} - \frac{b^2}{64} = 0 \quad (12) [1].$$

Тогда:

$$\begin{cases} x_{1,2,3,4} = \pm\sqrt{y_1} \pm\sqrt{y_2} \pm\sqrt{y_3} \\ (\pm\sqrt{y_1})(\pm\sqrt{y_2})(\pm\sqrt{y_3}) = -\frac{b}{8} \end{cases} (13),$$

где  $y_1, y_2, y_3$  – корни уравнения (12).

Продемонстрируем метод Декарта-Эйлера на примере.

*Пример.* Решить уравнение  $x^4 - x^3 - 4x^2 - x + 1 = 0$  (14).

*Решение.*

Приведем уравнение (14) в неполный вид, выполнив замену:

$$x = y - \frac{a}{4} = y - \frac{-1}{4} = y + \frac{1}{4}.$$

Подставим это выражение в уравнение:

$$\left(y + \frac{1}{4}\right)^4 - \left(y + \frac{1}{4}\right)^3 - 4\left(y + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(y + \frac{1}{4}\right) + 1 = 0$$

и получим неполное уравнение

$$y^4 - \frac{35}{8}y^2 - \frac{25}{8}y + \frac{125}{256} = 0 \quad (15).$$

Допустим,  $y = z_1 + z_2 + z_3$ .

Тогда

$$(z_1 + z_2 + z_3)^4 - \frac{35}{8}(z_1 + z_2 + z_3)^2 - \frac{25}{8}(z_1 + z_2 + z_3) + \frac{125}{256} = 0.$$

После преобразований, данное уравнение будет принимать вид

$$\begin{aligned} & (z_1^2 + z_2^2 + z_3^2)^2 + (z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3) \left( 4(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2) - \frac{35}{4} \right) + \\ & + 4(z_1^2z_2^2 + z_1^2z_3^2 + z_2^2z_3^2) + (z_1 + z_2 + z_3) \left( 8z_1z_2z_3 - \frac{25}{8} \right) - \frac{35}{8}(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + \frac{125}{256} = 0. \end{aligned}$$

Пусть,  $8z_1z_2z_3 - \frac{25}{8} = 0$  и  $4(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2) - \frac{35}{4} = 0$ . Тогда получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 8z_1z_2z_3 - \frac{25}{8} = 0 \\ 4(z_1^2 + z_2^2 + z_3^2) - \frac{35}{4} = 0 \end{cases} ;$$

$$(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + 4(y_1^2y_2^2 + y_1^2y_3^2 + y_2^2y_3^2) - \frac{35}{8}(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + \frac{125}{256} = 0$$

$$\begin{cases} z_1z_2z_3 = \frac{25}{64} \\ z_1^2z_2^2z_3^2 = \frac{625}{4096} \\ z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \frac{35}{16} \\ z_1^2z_2^2 + z_1^2z_3^2 + z_2^2z_3^2 = \frac{275}{256} \end{cases} .$$

Получим кубическое уравнение по теореме Виета

$$z^3 - \frac{35z^2}{16} + \frac{275z}{256} - \frac{625}{4096} = 0,$$

которое имеет корни

$$z_1 = \frac{5}{16}, z_2 = \frac{25}{16}, z_3 = \frac{5}{16}.$$

Теперь нужно отобразить корни уравнения (15) по условию (13).

Путем комбинаций, получим следующие корни

$$y_1 = \frac{5}{4} + \frac{\sqrt{5}}{2}, y_2 = -\frac{5}{4}, y_3 = -\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{5}{4}, y_4 = -\frac{5}{4}.$$

Теперь выполним обратную замену и найдем корни уравнения (14)

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, x_2 = -1, x_3 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, x_4 = -1.$$

Ответ:  $15 \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, -1, \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, -1.$

Решение уравнений четвертой степени сопряжено с определенными вычислительными сложностями, особенно при использовании методов Феррари и Декарта-

Эйлера. Сложность расчетов по решению уравнений четвертой степени связана с необходимостью выполнения многочисленных математических преобразований. Это требует глубокого понимания математических понятий, тщательного контроля точности и правильности каждого шага процесса расчета.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арефьев, В.А. Решение уравнений четвертой степени по методу Феррари / В.А. Арефьев. – URL: <https://ark.ru/wp-content/uploads/2019/08/Metody-resheniya-uravneniya-chetvyortoj-stepeni-V.A.-Arefiev.pdf> (дата обращения: 10.02.2024). – Текст : электронный.
2. Гиндикин, С.Г. Рассказы о физиках и математиках / С.Г. Гиндикин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1985. – 182 с. – Текст : непосредственный.
3. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров : справочник / С.Г. Гиндикин, Т. Корн. – Москва : Наука, 1973. – 832 с. – Текст : непосредственный.
4. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – 9-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 430 с. – Текст : непосредственный.
5. Многочлен 4 степени и его корни. – URL: <https://olymp.hse.ru/mirror/pubs/share/854940687.pdf> (дата обращения: 15.01.2024).
6. Виленкин, Н.Я. За страницами учебника математики / Н.Я. Виленкин, Л.П. Шибасов, Э.Ф. Шибасова. – Москва : Просвещение : Учебная литература, 1996. – 320 с. – Текст : непосредственный.
7. Решение уравнений 4-ой степени. Метод Феррари. – URL: <https://www.resolventa.ru/spr/algebra/ferrary.htm> (дата обращения: 13.01.2024). – Текст : электронный.
8. Михалкин, Е.Н. Гипергеометрическая интерпретация формулы Декарта-Эйлера для решения уравнения четвертой степени / Е.Н. Михалкин. – Текст : непосредственный // Прикладная математика & Физика. – 2021. – № 3. – С. 230-234.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Т.А. Оболдина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: [Tatiana.oboldina@yandex.ru](mailto:Tatiana.oboldina@yandex.ru).

П.Е. Кед, студентка 3 курса, Институт информационных технологий, точных и естественных наук, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: [polinaked6@mail.com](mailto:polinaked6@mail.com).

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

T.A. Oboldina, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physics, Mathematics and Information Technology Education, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: [Tatiana.oboldina@yandex.ru](mailto:Tatiana.oboldina@yandex.ru).

P.E. Ked, 3<sup>th</sup> year Student, Institute of Information Technology, Exact and Natural Sciences, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: [polinaked6@mail.com](mailto:polinaked6@mail.com).